

FOETO-INFANTIELE STERFTE IN HET BRUSSELS EN WAALS GEWEST

Auteurs: Charlotte Leroy, Virginie Van Leeuw

In deze infografic presenteert de belangrijkste bevindingen van het rapport over foeto-infantiele sterfte en doodsoorzaken in het Brussels en Waals Gewest.

INLEIDING

De foetale en infantiele sterfte is een belangrijk aandachtspunt. Ze geeft de kwaliteit weer van de prenatale en de kindercare, de gezondheid van de moeders en de maatschappelijke factoren. De analyses zijn essentieel om de gezondheid en het welzijn van pasgeboren baby's in te schatten.


METHODOLOGIE

De analyses hebben betrekking op de statistische overlijdensaangiften van kinderen in het eerste levensjaar (levenloos geboren kinderen inbegrepen), die zich voordoen in de Brussels en Waals gewesten tussen 2017 en 2022, ongeacht de woonplaats van het kind.


Bij foetale sterfte wordt rekening gehouden met zowel spontane foetale sterfte als medische zwangerschapsafbreking. Op het statistisch overlijdensaangiften hoeft geen onderscheid te worden gemaakt tussen deze twee soorten sterfgevallen.

OVERZICHT 2017-2022

De foetale sterftegraad stijgt tussen 2017 en 2022 (7,8 tot 8,5 ‰). Enkel het jaar 2020 vertoont lagere waarden. De infantiele sterftegraad waarde stijgt tussen 2017 en 2019, om dan te dalen tot 2,9 voor 1 000 levend geboren kinderen in 2021. Bij de verschillende categorieën van infantiele sterfte, volgen de vroeg- en de laat-neonatale sterfte dezelfde tendens, terwijl de post-neonatale sterfte daalt tussen 2017 en 2022 (1,5 tot 1,0 ‰).



DOODGEBORENEN




De sterftegraad die verband houdt met aangeboren afwijkingen, die stabiel bleef tussen 2017 en 2020, steeg tussen 2020 en 2022 van 3,1 tot 4,3 ‰.


De verdeling van deze doodsoorzaken verschilt naargelang de verblijfplaats van de moeder, waarbij het aandeel van aangeboren afwijkingen bij overleden foetussen lager is bij moeders die in België wonen (38,7 %) dan het aandeel overleden foetussen bij moeders uit het buitenland (86,2 %). De foetale sterftegraad sterk stijgt voor de moeders die in het buitenland wonen van 2017 tot 2022, met enkel in 2020 een breuk in de stijgende tendens, terwijl de foetale sterfte vrij stabiel blijft tussen 2019 en 2022 bij de moeders die in België wonen (niet afgebeeld).

INFANTIELE STERFTE

Van 2017 tot 2022 blijft de infantiele sterftegraad die verband houdt met aangeboren afwijkingen vrij stabiel, om dat te dalen van 0,9 tot 0,6 voor 1 000 levend geboren kinderen. De infantiele sterftegraad die verband houdt met perinatale of infantiele aandoeningen daalde van 2,6 tot 2,0 voor 1 000 levend geboren kinderen.



FOETALE EN INFANTIELE STERFTE



De globale analyse van de doodsoorzaken van levenloos geboren of in het eerste levensjaar overleden kinderen, toont aan dat de verdeling verschilt naargelang het soort sterfte. Aangeboren afwijkingen zijn de voornaamste doodsoorzaak bij bijna de helft van de doodgeborenen. Bij kinderen die overlijden tijdens de neonatale periode is de voornaamste doodsoorzaak een perinatale of infantiele aandoening. Wiegendood en kinderen die sterven door externe oorzaken maken één op de vijf post-neonatale sterfgevallen uit.

BESLUIT

Een analyse van de foetale en infantiele sterfte en de oorzaken ervan brengt een aantal bevindingen aan het licht:

- Stijging van de foetale sterfte
 - voornamelijk door een toename van het mortinataliteitsgraad, die kan worden toegewezen worden aan een aangeboren afwijking
 - stijging van het percentage bij moeders die in het buitenland wonen
- Daling van de infantiele sterftegraad sinds 2019
 - voornamelijk door een verlaag van het infantiele sterftegraad, die kan worden toegewezen worden aan een aangeboren afwijking

De voorgestelde resultaten in dit rapport zijn de weergave van een gedetailleerde beschrijvende analyse van de overlijdensaktes van kinderen in het eerste levensjaar en moeten de vergelijking mogelijk maken van de oorzaken foetale en infantiele sterfte tussen landen, om zo de actiepunten te bepalen om die sterftegraad verder te doen dalen, zoals aanbevolen door de WGO.

Gebaseerd op het rapport :

Leroy Ch., Van Leeuw V. Foeto-infantiele sterfte - Doodsoorzaken in het Brussels en Waals Gewest - Jaren 2017 tot 2022. Centre d'Épidémiologie Périnatale, 2024.

Citeer deze infographic als volgt :

Leroy Ch., Van Leeuw V. Foeto-infantiele sterfte - Doodsoorzaken in het Brussels en Waals Gewest - Jaren 2017 tot 2022. [Infographic]. Centre d'Épidémiologie Périnatale, 2024